

लो फ्लोर हाई सीलिंग

कक्षा के भीतर

चतुर चतुर्भुज

स्वाती सरकार व स्नेहा टाइटस

मुख्य शब्द : चतुर्भुज, भुजा की लम्बाई, कोण, समद्विबाहु, समलम्ब, चक्रीय, बड़ा खण्ड, लघु खण्ड।

गणितीय खोजबीन विद्यार्थियों के लिए अपनी व्यवस्थित तर्कशक्ति और गणितीय दृढ़ता को सहज व हल्के-फुल्के ढंग से विकसित करने का एक रोमांचक तरीका है। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खोजबीन तैयार करना हमेशा आसान नहीं होता। साथ ही, शिक्षक को इस कार्य को कुछ ऐसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है कि विद्यार्थी अपनी खोजबीन की ज़िम्मेदारी खुद ले और अपने कौशल को स्वाभाविक रूप से विकसित कर सकें।

खोजबीन दैनिक गणित कार्य का स्वाभाविक हिस्सा बनकर विद्यार्थियों को कुछ ऐसे मदद करती है :

- सवालों को गहराई से टटोलने में
- उन्हें मिले कुछ सवालों को एक-से अधिक तरीके से हल करने के रास्ते खोजने में
- गणितीय तरीके से तर्क करने और समस्या समाधान की रणनीति विकसित करने में
- गणितीय सोच और तर्कशक्ति को जाँचने और समझाने में
- अपने विचार 'स्पष्ट और संक्षिप्त' संकेतों के साथ मौखिक व लिखित रूप से व्यक्त करने में
- अपनी सोच को मॉडल, रेखाचित्रों और ग्राफ़ के ज़रिए प्रस्तुत करने में
- गणितीय विचारों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने में
- अपने विचार दूसरों के लिए सिद्ध कर पाने में
- संगणकीय कौशल – किफ़ायत, सटीकता व लचीलापन – विकसित करने में
- तरह-तरह के उपकरणों में से और उपयुक्त टेक्नोलॉजी का चुनाव करने में
- विविध समूहों में – पूरी कक्षा के साथ, व्यक्तिगत रूप से, जोड़ों में और छोटी टोलियों में काम करने में

स्रोत : <http://www.canalwinchesterschools.org/WTIMP.aspx>

निस्सन्देह ये लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। यहाँ चतुर्भुजों के प्रकारों पर एक खोजबीन प्रस्तुत है। यह कुछ सरल व्यावहारिक गतिविधियों और जाँच-परिणामों के दस्तावेज़ीकरण से शुरू होकर समद्विबाहु समलम्बों (**isosceles trapeziums**) को लेकर कुछ अटकलों और अन्ततः प्रमाण तक पहुँचती है। कई बिन्दुओं पर, कुछ सम्भावित खोजबीन प्रश्न हैं। विद्यार्थी इनमें सीधे चलने की बजाय थोड़ा इधर-उधर जा सकते हैं। अलबत्ता, इस भटकाव से बचाने के लिए हमने इन्हें ***IQ#** से अंकित किया है। इन सुझावों के आधार पर, इच्छुक शिक्षक या विद्यार्थी कई नई खोजबीन डिज़ाइन कर सकते हैं।

भाग एक : चतुर्भुजों का वर्गीकरण

जिस प्रकार एक त्रिभुज नियम होता है, जिसके अनुसार एक त्रिभुज की किसी भी एक भुजा की लम्बाई बाकी दो भुजाओं की लम्बाई के अन्तर से अधिक और उनके योग से कम होती है, उसी प्रकार हमारे पास एक चतुर्भुज नियम है। इसके अनुसार, चतुर्भुज की किसी भी एक भुजा की माप बाकी तीन भुजाओं की मापों के योग से कम होती है।

1. इस नियम को ध्यान में रखते हुए, आप कितने प्रकार के चतुर्भुज बना सकते हैं

अ. माचिस की 4 तीलियों से

ब. माचिस की 8 तीलियों से

स. माचिस की 12 तीलियों से

द. माचिस की 16 तीलियों से


अपने नतीजे एक तालिका में निम्नानुसार दर्ज कीजिए (कुछ नतीजे दिए गए हैं, पर इस गतिविधि में विद्यार्थियों की दक्षता के आधार पर उनके लिए कुछ चुनिन्दा परिणाम दिए जा सकते हैं।

***IQ1 :** भले ही हमने केवल व्यावहारिक रूप से सम्भव चतुर्भुज प्रस्तुत किए हैं, पर 4, 8, 12 या 16 का योग देने वाली भुजाओं की सभी सम्भव मापों की सम्पूर्ण श्रेणी की खोजबीन करना और उन संयोजनों को चुनना उपयुक्त हो सकता है, जो चतुर्भुजों की भुजाओं को दर्शाते हों। विद्यार्थियों को अपनी तर्क प्रक्रिया लिखने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

माचिस की तीलियों की संख्या	भुजाओं के संयोजन	सम्भावित चतुर्भुज
4 तीलियाँ	1-1-1-1	समचतुर्भुज
8 तीलियाँ	2-2-2-2	समचतुर्भुज

(जाँचिए, 1-2-4-1 क्यों सम्भव नहीं है)	1-3-1-3	समान्तर चतुर्भुज
	1-1-3-3	पतंग व शंकु (dart)
12 तीलियाँ	3-3-3-3	
		समान्तर चतुर्भुज
	2-2-4-4	
	2-2-3-5	समद्विबाहु समलम्ब व सामान्य चतुर्भुज
		बराबर आसन्न भुजाओं के एक युग्म वाले सामान्य चतुर्भुज
		चार असमान भुजाओं वाले सामान्य चतुर्भुज
16 तीलियाँ		
	:	:

2. पैटर्न का सामान्यीकरण करने की कोशिश करें और उसे एक वृक्ष-रेखाचित्र में निम्नानुसार दर्शाएँ :




*IQ2 : इस वृक्ष-रेखाचित्र की हर शाखा का इस्तेमाल कर कई खोजी प्रश्न डिज़ाइन किए जा सकते हैं। जो विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की बुनियादी परिभाषा जानते हैं, वे देख सकते हैं कि कौन-सी शाखाएँ व्यावहारिक रूप से सम्भव (केवल सैद्धान्तिक रूप से नहीं) किसी विशेष प्रकार का चतुर्भुज बना सकती हैं।

*IQ3 : यह विद्यार्थियों के लिए रैखिक सममिति (line symmetry) का अध्ययन करने का मौका भी है और वे इन सभी चतुर्भुजों को सममित रेखा के होने व न होने के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं।

*IQ4 : और वे जो अवतल (**concave**) और उत्तल (**convex**) चतुर्भुजों से खेलना चाहते हैं, हमारा सुझाव रहेगा कि वे स्ट्रॉ मॉडल से जाँच करें कि इनमें से कौन-से चतुर्भुज अवतल और कौन-से उत्तल हो सकते हैं। स्ट्रॉ मॉडल बनाने के निर्देश बॉक्स में दिए गए हैं।

ऊपर दिए गए किसी भी चौकोर का स्ट्रॉ मॉडल बनाने के लिए, लगभग बराबर लम्बाई के दो स्ट्रॉ लीजिए और उन्हें उस चतुर्भुज के गुणधर्म के अनुसार चार टुकड़ों में काट दीजिए।



चित्र-1

उदाहरण के लिए, चार असमान भुजाओं वाला कोई चौकोर बनाने के लिए : एक स्ट्रॉ को लगभग बराबर टुकड़ों में काट दीजिए, लेकिन बिल्कुल आधा भी नहीं, ताकि एक हिस्सा दूसरे हिस्से से थोड़ा-सा लम्बा हो – यहाँ $b < c$ है। दूसरे स्ट्रॉ को ऐसे काटिए कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से से काफी लम्बा हो – यहाँ $a < d$ है।

काटने का उपरोक्त तरीका और स्ट्रॉ की लगभग बराबर लम्बाई $a < b < c < d$ को सुनिश्चित करते हैं। अब इन्हें, स्टेपलर की मदद से, किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए ताकि हमें उसके अनुसार चतुर्भुज मिल जाए। स्टेपल करने के दौरान, पिन का केवल एक दाँत ही स्ट्रॉ के अन्दर से गुज़रना चाहिए जबकि दूसरा पूरी तरह से बाहर रहेगा। स्टेपल करने के बाद सभी स्ट्रॉ आसानी से घूमने चाहिए जिससे कि उनके बीच कोणों की एक रैंज बन सके।

3. ऊपर प्रस्तुत शाखाओं में से कौन-सी समद्विबाहु समलम्ब बना सकती हैं?

शिक्षक के लिए :

विद्यार्थियों को समद्विबाहु समलम्ब की परिभाषा को ताज़ा करने की ज़रूरत हो सकती है – यूक्लिडियन ज्यामिति में, **समद्विबाहु समलम्ब** एक ऐसा उत्तल चतुर्भुज होता है जिसकी सममित रेखा सम्मुख भुजाओं के किसी एक जोड़े को समद्विभाजित करती है। यह समलम्ब का एक विशेष प्रकार है। किसी भी समद्विबाहु समलम्ब में, दो सम्मुख

भुजाएँ (आधार) समान्तर होती हैं और अन्य दो भुजाएँ बराबर माप की होती हैं (यह गुणधर्म समान्तर चतुर्भुज के समान है)। विकर्ण भी बराबर माप के होते हैं। एक समद्विबाहु समलम्ब के आधार कोण भी बराबर माप के होते हैं (दरअसल, बराबर आधार कोणों के दो जोड़े होते हैं, जहाँ एक आधार कोण अन्य आधार के एक कोण का सम्पूर्ण कोण होता है)।

https://en.wikipedia.org/wiki/Isosceles_trapezoid

*IQ5 : गणित और खासतौर पर ज्यामिति समतुल्य स्थितियों से भरा हुआ है, जैसा कि ऊपर दिए गए विस्तृत विवरण में काफी हद तक देखा जा सकता है। समद्विबाहु समलम्ब विद्यार्थियों को ऐसी समतुल्य स्थितियों को जाँचने-परखने का मौका देते हैं। एक नमूना प्रश्न – ‘यदि किसी चतुर्भुज की सममिति रेखा सम्मुख भुजाओं को समद्विभाजित करती है, तो उस चतुर्भुज के अन्य गुणधर्म क्या होंगे?’

*IQ6 : इसका उल्टा तो और रोचक होगा। ऊपर दिए गए सवाल का उल्टा क्या है? एक समद्विबाहु समलम्ब को परिभाषित करने के लिए कम-से-कम किन शर्तों का उल्लेख करना ज़रूरी है?

वृक्ष-रेखाचित्र में, चार बराबर भुजाओं वाले चतुर्भुजों (सामान्यतः समचतुर्भुज) और बराबर सम्मुख भुजाओं के दो युग्म वाले चतुर्भुजों (सामान्यतः समान्तर चतुर्भुज) के अलावा केवल पाँच प्रकार ही समद्विबाहु समलम्ब बना सकते हैं। वे हैं, जहाँ :

i. तीन भुजाएँ बराबर और अपेक्षाकृत लम्बी हों, $b-b-b-a$

के रूप में प्रदर्शित

ii. तीन भुजाएँ बराबर और अपेक्षाकृत छोटी हों, $a-a-a-b$ के रूप में प्रदर्शित

iii. केवल दो भुजाएँ बराबर व सम्मुख और सबसे छोटी हों,

$a-b-a-c$ के रूप में प्रदर्शित

iv. केवल दो भुजाएँ बराबर व सम्मुख और मध्यम माप की हों, $b-a-b-c$ के रूप में प्रदर्शित

v. केवल दो भुजाएँ बराबर व सम्मुख और सबसे लम्बी हों, $c-a-c-b$ के रूप में प्रदर्शित सभी जगह हम यह संकेत इस्तेमाल करेंगे कि $a < b < c$


भाग दो : समान्तर चतुर्भुजों के ज़रिए समलम्बों तक बढ़ना

1. मान लीजिए आपको एक समान्तर चतुर्भुज की दोनों आसन्न भुजाओं की माप दी गई है। अब आप कितने समान्तर चतुर्भुज बना सकते हैं?
2. मान लीजिए आपको एक समलम्ब की सभी चार भुजाओं की माप दी गई है, आप कितने समलम्ब बना सकते हैं? निम्नलिखित उदाहरण से जाँचिए।

एक समलम्ब ABCD बनाइए जहाँ $AB = 3$ सेमी, $BC = 4$ सेमी, $CD = 5$ सेमी, $AD = 7$ सेमी। मान लीजिए, $AD \parallel BC$ ।

सुराग :

$\triangle CDE$ बनाएँ जहाँ $CD = 5$ सेमी, $CE = 3$ सेमी और $DE = 3$ सेमी हों और DE को DA तक बढ़ाएँ जिसकी लम्बाई 7 सेमी हो। फिर C से, $CB = 4$ सेमी बनाएँ जो DA के समान्तर हो। ऐसे कितने समलम्ब हो सकते हैं?



चित्र-2 : समलम्ब चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएँ दी गई हैं

शिक्षक के लिए टिप्पणी :

ऐसे असंख्य समान्तर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं क्योंकि दी गई भुजाओं के बीच का कोण 0° और 90° के बीच कुछ भी हो सकता है। लेकिन, यदि चारों भुजाओं की लम्बाई दी गई है और यह बता दिया गया है कि कौन-सी भुजाएँ समान्तर हैं, तब केवल एक समलम्ब ही इन शर्तों को पूरा करता है।

3. क्या आप एक चतुर्भुज ABCD बना सकते हैं, उन्हीं भुजाओं के साथ जो स्थिति 2 में दी गई हैं ($AB = 3$, $BC = 4$, $CD = 5$, $DA = 7$) लेकिन जहाँ $AB \parallel CD$ हो? कारण सहित बताइए।

शिक्षक के लिए टिप्पणी :

मान लीजिए यह सम्भव है। तो CD पर एक बिन्दु होगा E, कुछ इस तरह कि $CE = AB = 3$ सेमी और $ED = 2$ सेमी। AE को जोड़ें। अब $AB \parallel CD \Rightarrow AB \parallel CE$ और $AB = CE \Rightarrow ABCE$ एक समान्तर चतुर्भुज है $\Rightarrow BC = AE = 4$ सेमी। अब $\triangle ADE$ में, $AD = 7$ सेमी $< AE + ED = 4$ सेमी + 2 सेमी = 6 सेमी, जो कि एक विरोधाभास है! तो इस स्थिति में समलम्ब बनाना असम्भव है।

4. तो अब इसका सामान्यीकरण करें : तर्क की सामान्यता को गँवाए बगैर

(इस बात को कहने के लिए गणितज्ञ जिस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं

– without loss of generality जिसका मतलब होता है कि इस विशिष्ट प्रकरण


के तर्क को सामान्य तौर पर लागू किया जा सकता है) एक समलम्ब ABCD

की कल्पना कीजिए, कुछ इस तरह कि

$BC \parallel AD$ और $BC < AD$ (ध्यान दें कि $BC = AD$ का अर्थ तो होगा

कि ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है)। ऊपर स्थिति 2 में बताए तरीके से समलम्ब ABCD

का विभाजन समान्तर चतुर्भुज ABCE और $\triangle CDE$ में कीजिए।



चित्र-3

- A. यदि $BA \leq CD$ हो, तो तर्क की सामान्यता को गँवाए बगैर $BC + CD$ के मुकाबले $BA + AD$ कम, बराबर या ज़्यादा होगा?
- B. यदि $BC < AD$, $BA \leq CD$ और $BA + AD > BC + CD$, तो क्या समलम्ब ABCD बनाना सम्भव है जहाँ $BC \parallel AD$ हो?
- C. $BC < AD$, $BA \leq CD$ और $BA + AD > BC + CD$ दिए गए हैं, तो क्या आप इससे एक समलम्ब बना सकते हैं जिसमें $AB \parallel CD$ हो?
- D. आपको क्या लगता है, क्या होगा अगर $AB + BC = CD + DA$?

शिक्षक के लिए टिप्पणी :

$\triangle ADE$ की भुजाओं के लिए, जहाँ $AE = BC$, त्रिभुज असमानता नियम का इस्तेमाल करते हुए और इस तथ्य का भी इस्तेमाल करते हुए कि ABCE एक समान्तर चतुर्भुज है, यह दर्शाया जा सकता है कि $CD < BA + AD - BC \Rightarrow BA + AD > BC + CD$ । नोट कीजिए कि यह मामूली बात नहीं है क्योंकि $AD > BC$ पर $BA \leq CD$ ।

इसका उल्टा भी सत्य है। $BC \parallel AD$ के लिए समलम्ब बनाया जा सकता है (2 में दिए गए सुराग का पालन करें) किन्तु $AB \parallel CD$ के लिए ऐसा नहीं हो सकता (3 के लिए दी गई शिक्षक टिप्पणी देखें)। तो $BC < AD$ और $BA \leq CD$ के लिए $BC \parallel AD$ केवल तब ही होगा यदि $BA + AD > BC + CD$ हो।

जब $AB + BC = CD + DA$, तब त्रिभुज असमानता नियम $\triangle ADE$ को पिचकाकर CD रेखाखण्ड में बदल देती है जिससे समान्तर चतुर्भुज $ABCE$, रेखाखण्ड $BC + CD$ में सिमट जाता है। और हमें मिलता है एक विकृत (degenerate) समलम्ब जो एक रेखाखण्ड $BD = BC + CD = BA + AD$ के रूप में पिचक चुका होता है।

भाग तीन : समद्विबाहु समलम्ब

1. किसी भी समद्विबाहु समलम्ब पर विचार कीजिए। क्या वह चक्रीय है?
2. किसी भी चक्रीय समलम्ब पर विचार कीजिए। क्या वह समद्विबाहु है?

शिक्षक के लिए टिप्पणी :

मान लीजिए $ABCD$ एक समद्विबाहु समलम्ब है जहाँ $BC \parallel AD$ और $BA = CD$ । तब $\angle D = \angle A$ । [सुराग : इसे सिद्ध करने के लिए, समलम्ब को एक समान्तर चतुर्भुज और एक त्रिभुज में विभाजित कीजिए।]

मान लीजिए, तर्क की मान्यता गँवाए बगैर, $BC < AD$ ($BC = AD$ का अर्थ हुआ $ABCD$ एक आयत है जो कि चक्रीय है)। तो $\angle A + \angle C = \angle D + \angle C = 180^\circ$ चूँकि $BC \parallel AD$ । इसलिए $\angle B + \angle D = 360^\circ - (\angle A + \angle C) = 180^\circ \Rightarrow ABCD$ चक्रीय है।

इसके बाद, अब मान लीजिए $ABCD$ एक चक्रीय समलम्ब है, यानी कि $BC \parallel AD$ और $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$ । $\angle A + \angle C = 180^\circ = \angle C + \angle D$ चूँकि $BC \parallel AD$ । तो $\angle A = \angle D \Rightarrow AB = CE = CD$, यानी कि $ABCD$ समद्विबाहु है। [यह आखिरी चरण ऊपर दिए गए उसी सुराग का इस्तेमाल कर सिद्ध किया जा सकता है।]

इसलिए, कोई समलम्ब केवल तब ही समद्विबाहु होगा जब वह चक्रीय होगा।


*IQ7 : यदि मैं एक समद्विबाहु समलम्ब बनाना चाहूँ तो मुझे कम-से-कम कितनी जानकारी की ज़रूरत होगी? नोट : ऐसी कई सम्भावनाएँ हैं, उदाहरण के लिए – (i) समान्तर भुजाएँ और उनके बीच की दूरी, (ii) समान्तर भुजाएँ और एक आधार कोण आदि। ऐसी ही ज़्यादा-से-ज़्यादा सम्भावनाएँ लिस्ट करने की कोशिश करें।

3. एक समद्विबाहु समलम्ब $a-c-b-c$ पर विचार कीजिए (याद रखिए कि $a < b < c$)। हमने अभी देखा कि यह चक्रीय होगा। क्या ऐसे समलम्ब को एक लघु वृत्तखण्ड में फिट कर सकते हैं?
4. पता कीजिए कि क्या समद्विबाहु समलम्ब $a-b-b-b$ हमेशा दीर्घ वृत्तखण्ड में ही रहेगा।


शिक्षक के लिए टिप्पणी :

$\triangle SQR$ (चित्र-4) में, $SR = b < QR = c \Rightarrow \angle SQR < \angle QSR \Rightarrow \angle SQR$ न्यून कोण (acute angle) है \Rightarrow $SPQR$ एक दीर्घ चाप (major arc) है।

ऐसा ही एक प्रमाण समलम्ब $a-b-b-b$ (चित्र-5) के लिए बनाया जा सकता है।



चित्र-4 : समद्विबाहु समलम्ब a-c-b-c



चित्र-5 : समद्विबाहु समलम्ब a-b-b-b

5. समद्विबाहु समलम्ब a-a-a-b पर विचार कीजिए (याद रखिए कि $a < b$)।

नोट कीजिए कि लेख की शुरुआत में उल्लिखित चतुर्भुज असमानता को सन्तुष्ट करने के लिए $b < 3a$ होना चाहिए।


क. मान लीजिए इस समलम्ब की सबसे लम्बी भुजा व्यास पर है।

सिद्ध कीजिए कि $b = 2a$ ।

ख. a और b के बीच के सम्बन्ध का पता लगाइए यदि यह

चतुर्भुज निम्नानुसार फिट बैठता है

- i. एक लघु वृत्तखण्ड में
- ii. एक दीर्घ वृत्तखण्ड में



चित्र-6 : अर्ध-वृत्त में समद्विबाहु समलम्ब

शिक्षक के लिए टिप्पणी :

$$SP = PQ = QR = a$$

$$SR = b$$

$$\angle PQS = \angle QSR = \theta \text{ (एकान्तर कोण होने के चलते)}$$

$$\angle PQS = \angle PSQ = \theta \text{ (समद्विबाहु त्रिभुज होने के चलते)}$$

$$\therefore \angle PSR = 2\theta$$

$$\angle SQR = 90^\circ \text{ (अर्धवृत्त में कोण)}$$

$$\therefore \angle PQR = 90^\circ + \theta = \angle QPS$$

$$\text{और } \angle PSR = \angle QRS = 90^\circ - \theta = 2\theta \text{ (सम्पूरक कोण)}$$

$$\therefore 90^\circ - \theta = 2\theta \Rightarrow \theta = 30^\circ$$

$$\Delta QOR \text{ में, } \angle OQR = \angle QRO = 90^\circ - \theta = 60^\circ$$

$$\angle QOR = 2\theta = 60^\circ$$

इसलिए ΔOQR समबाहु है और $\therefore QR = a = OR = b/2$

यदि PQRS लघु वृत्तखण्ड में फिट हो जाता है, तो $\angle SQR > 90^\circ$ जिसका आशय है कि $SP = PQ = QR$ (जो दिया गया है), के लिए S और R को कुछ और दूर होना चाहिए जिसके

परिणामस्वरूप एक बड़ा परिवृत्त बनेगा $\Rightarrow b > 2a$ और इसी तरह यदि यह दीर्घ वृत्तखण्ड में फिट होता है, तो $b < 2a$ ।

ऐसे ही अन्वेषण बाकी के दो समद्विबाहु समलम्ब के लिए किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

हम उम्मीद करते हैं कि आपको खोजबीन करने और अपनी खोजों के बारे में लिखने में मज़ा आएगा। इन गतिविधियों को **GeoGebra** जैसे गतिशील ज्यामिति सॉफ्टवेयर पर ज़रूर आजमाएँ। पक्का है कि आप कुछ मज़ेदार खोज करेंगे। और उन्हें लिखना न भूलिएगा।

स्वाती सरकार स्कूल ऑफ़ कंटीन्यूइंग एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रिसोर्स सेंटर, अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ व्याख्याता और स्रोत व्यक्ति हैं। उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट से बी स्टैट-एम स्टैट और यूनिवर्सिटी ऑफ़ वॉशिंगटन, सीएटल से गणित में एमएस किया है। वे बच्चों व शिक्षकों के साथ, 5 वर्षों से भी अधिक समय से, गणित पर काम कर रही हैं। उन्हें कुछ भी करके देखना, खासतौर पर ओरिगामी बेहद दिलचस्प लगता है। उनसे swati.sircar@apu.edu.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

स्नेहा टाइटस स्कूल ऑफ़ कंटीन्यूइंग एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रिसोर्स सेंटर, अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक हैं। गणित की खूबसूरती, तार्किकता और प्रासंगिकता साझा करना उनका जुनून है। स्नेहा ग्रामीण व शहरी स्कूलों के गणित के अध्यापकों को मेंटर करती हैं। सवाल हल करने के ज़रिए कौशल विकास और शैक्षणिक रणनीतियों से गणित सिखाने की कार्यशालाएँ संचालित करती हैं। उनसे sneha.titus@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : अतुल वाधवानी **अनुवाद पुनरीक्षण :** सुशील जोशी

कॉपी-एडिटर : अनुज उपाध्याय (सभी एकलव्य फ़ाउण्डेशन)

सम्पादन : राजेश उत्साही, कविता तिवारी